

PREPARACION COLONICA; NULITELY

UNA SEMANA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

1. Determinar la persona que maneja su automóvil al ir al procedimiento
2. Suspender el uso de aspirina y tabletas de hierro una semana antes del Procedimiento.
3. Compre 4 sobres de Nulitely
5. Una caja de Liberan tabletas.

UN DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- **Por la mañana:**
 - Desayune- coma ligero: usted puede desayunar cereales y leche (no frutas secas)
 - Usted puede tomar jugo de naranja (sin pulpa), café o té.
- **Al medio día:**
 - Almuerzo: coma ligero. Se permite tomar una sopa sin vegetales, te o agua mineral.
- **Por la tarde:**
 - No cene
 - 4:00 pm. Prepare 4 litros de Nulitely (1 sobre en cada litro con agua) y manténgalo en refrigeración.
 - 5:00 pm: Tome un vaso de la preparación de Nulitely cada 15 minutos hasta terminar 2 litros y guarde los otros 2 litros en el refrigerador para tomarlos por la mañana. También ingiera 2 tabletas de Liberan(Simeticona)
- **Por la noche:**
 - Tips para prevenir la irritación del área peri-anal
 - Administrar vaselina en área perianal antes de la primera evacuación.
 - Use algodón suave para limpiar el área perianal.

EL DIA DEL PROCEDIMIENTO:

Si su procedimiento está programado antes de las 12 pm.

- 3:00 am a 4:00 am: Tome 2 litros de Nulitely (un vaso cada 15 minutos) .
- Al terminar tome 2 tabletas de Liberan(Simeticona)

si su procedimiento está programado después de las 12 pm.

- 8:00 am a 9:00 am: Tome 2 litros de Nulitely (un vaso cada 15 minutos) .
- Al terminar tome 2 tabletas de Liberan(Simeticona) o Usted puede tomar por la mañana sus medicamentos para la presión arterial o para el corazón.

UC Endoscopy Center: Av. Luis Donaldo Colosio N°. 340, Col. Bosques Real, Playa del Carmen, Q. Roo Tel: (984) 109 2152

info@ucendoscopy.mx

Soporte de la preparación del colon: WhatsApp: 9841136147